

1年生雑草から多年生雑草まで
優れた除草効果を発揮します。
葉から吸収し根まで枯らして
長期間防除します。

根から吸収しないので
有用植物に安全です。

土の中では分解され
自然環境を痛めません。

毒性が極めて低いので
人畜等に安全です。

除草剤
幅広い適用作物

環境に優しい除草剤

グリホス®

農耕地から非農耕地まで



- 農薬の種類： グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
- 物理的・化学的性状： 淡黄色水溶性液体
- 有効成分の種類： イソプロピルアンモニウム= N- (ホスホノメチル) グリシナート…41.0%
- その他の成分： 水、界面活性剤等…59.0%
- 毒性： 普通物 LD₅₀ > 10,000mg / kg (原体)
- 魚毒性： A 類 TLm 48h コイ 119ppm (原体)
- 包装： 500ml × 20本 / 1ℓ × 10本 / 5ℓ × 4本



CBC株式会社

■適用作物・適用場所の範囲及び使用方法

1. 散布処理

作物名・適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤及びグリホサートを含む農業の総使用回数	使用方法	適用地帯
			薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)			
かんきつ、りんご、なし、ぶどう	スギナ	雑草生育盛期 但し、収穫7日前まで	2000	少量散布 25~50	3回以内		—
	一年生雑草	雑草生育期 但し、収穫7日前まで	250~500	通常散布 50~100			
かんきつ、りんご、なし、かき、ぶどう、くり、うめ、もも、おうとう	多年生雑草	生育盛期以降 (夏~秋期) 但し、収穫7日前まで	500~1000		1000		
	つる性多年生雑草、ササ類、落葉雑草かん木						
水田耕起前、水田畦畔、水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期 (耕起前では耕起の10日以前)	250~500	少量散布 25~50	水田畦畔：2回以内 その他：1回		
	多年生雑草	(水田畦畔は収穫14日前まで)	500~1000				
移植水稲 (不耕起栽培)	一年生及び多年生雑草	湛水前30~5日	500	50			
直播水稲 (不耕起栽培)		は種前30~5日					
大豆	畑地一年生雑草	雑草生育期 (は種10日以前)	250~500	通常散布 50~100	2回以内		
キャベツ、はくさい、だいこん、かんしょ、大麦		雑草生育期 (大麦は耕起10日以前、その他は耕起7日以前)					
小麦、さとうきび (春植え)	畑地多年生雑草	雑草生育期 (耕起10日以前)	500~1000	通常散布 50~100	1回		
茶	一年生雑草	雑草生育期 (春~夏期。但し、摘採7日前まで)	250~500				
花木	多年生雑草	雑草生育期 (但し、桑では発芽前又は夏切後発芽前)	500~1000	少量散布 25~50	休耕田：2回以内 桑・花木：4回以内		
桑、休耕田							
牧野・草地、(更新・造成)	一年生雑草	雑草生育期	250~500	通常散布 50~100	1回		北海道
	多年生雑草	(更新・造成の10日以前)	500~1000				
	一年生及び多年生雑草	耕起整地後 (雑草発生揃期) は種10日前~は種当日	250~500				
スギ・ヒノキ (下刈り代用)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、落葉雑草かん木	雑草生育期 (5~6月)	500	少量散布 15~20	3回以内		—
造林地 (地ごしらえ)		生育盛期以降 (夏~秋期)	1000	少量散布 20~30			

2. 農耕地以外での散布処理

作物名・適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤及びグリホサートを含む農業の総使用回数	使用方法
			薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)		
道路、鉄道、宅地、公園、運動場、駐車場、堤とう、のり面等	一年生雑草	雑草生育期	500	通常散布 50~100	3回以内	雑草木 茎葉散布
	多年生雑草		1000			
	クズ等のつる性多年生雑草、ササ類、落葉雑草かん木	1000~2000	少量散布 25~50			
	スギナ	生育盛期	2000	少量散布 25~50		

3. 塗布処理

作物名・適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数 (倍)	10アール当り塗布液量	本剤及びグリホサートを含む農業の総使用回数	使用方法
水田畦畔	雑草生育期、但し、収穫14日前まで					
桑						
芝生 (ラフ等)					2回以内	
スギ	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、落葉雑草かん木	雑草生育期	3	3ℓ	3回以内	
ヒノキ (下刈り代用)						
道路、鉄道、宅地、公園、運動場、駐車場、堤とう、のり面等	一年生及び多年生雑草			3~6ℓ		

4. 注入処理

適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用量	使用方法
林地	クズ	春期又は秋期		1~2mℓ/株	株頭注入処理
	落葉雑草かん木 間伐するスギ、ヒノキ	3月~10月	原液 又は2倍液	1mℓ/ヶ所	立木注入処理
				樹径	
10cm以下	2~3				
10~20cm	4~8				
20cm以上	10				

注意事項

●希釈水は清水をご使用ください。●雑草発生前の散布は効果がありません。●散布後6時間以内の降雨は効果を低下させます。●周辺の有用植物に散布液がつかからないよう十分注意してください。●本剤使用時には使用量、使用時期、使用方法を十分確認した上でご使用ください。●本剤散布に使用した器具類は使用後十分水洗いしてください。
※詳細は製品上に貼付のラベルをご覧ください。



輸入販売元 **CBC株式会社**
〒104-0052 東京都中央区月島2-15-13
TEL. (03) 3536-4750 FAX. (03) 3536-4781
製 造 **ケミノバアグロ**(デンマーク)